

Tabela 2. Swoiste zapobieganie wściekliznie u osób mających kontakt z chorym lub podejrzanym o wściekliznę zwierzęciem^a

Rodzaj kontaktu ze zwierzęciem	Stan zdrowia zwierzęcia		Zapobieganie ^b
	w chwili narażenia	podczas obserwacji weterynaryjnej ^b	
brak ran lub kontakt pośredni	–	–	niepotrzebne
oślinienie zdrowej skóry	–	–	niepotrzebne
oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie pogryzienia i zadrapania	zwierzę zdrowe	objawy wścieklizny	rozpoczęcie szczepienia ^c z chwilą zaobserwowania objawów wścieklizny u zwierzęcia
	zwierzę podejrzanе o wściekliznę	zwierzę zdrowe (niepotwierdzone objawy)	natychmiastowe rozpoczęcie szczepienia ^c → przerwij, gdy zwierzę zdrowe podczas obserwacji
	zwierzę wściekłe, dzikie, nieznanе, niebadane	–	natychmiastowe rozpoczęcie szczepienia ^c
głębokie pogryzienia, zadrapania, oślinienie błon śluzowych	zwierzę zdrowe	objawy wścieklizny	natychmiastowe rozpoczęcie szczepienia ^c + podanie swoistej immunoglobuliny (lub surowicy) ^d
	zwierzę podejrzanе o wściekliznę	zwierzę zdrowe (niepotwierdzone objawy)	natychmiastowe rozpoczęcie szczepienia ^c + podanie swoistej immunoglobuliny (lub surowicy) ^d → przerwij, gdy zwierzę zdrowe podczas obserwacji
	zwierzę wściekłe, dzikie, nieznanе, niebadane	–	natychmiastowe rozpoczęcie szczepienia ^c + podanie swoistej immunoglobuliny (lub surowicy) ^d

^a Kwalifikację do szczepienia i profilaktyki czynno-biernej przeprowadza specjalistyczna poradnia chorób zakaźnych.

^b Rozpoczęcie postępowania poekspozycyjnego można odłożyć do czasu potwierdzenia wścieklizny u zwierzęcia, jeśli nie wykazywało ono objawów choroby podczas ekspozycji. 15-dniową obserwację weterynaryjną można zastosować wyłącznie w odniesieniu do zwierząt domowych, takich jak psy i koty.

^c **Swoiste zapobieganie czynne:** szczepienie wg skróconego, poekspozycyjnego schematu (5 dawek w dniu: 0., 3., 7., 14. i 30.) zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki; jeżeli została narażona osoba uprzednio szczepiona przeciwko wściekliznie, podaje się tylko 2 dawki przypominające szczepienia w odstępie 3 dni (nie należy wówczas podawać swoistej immunoglobuliny).

^d **Swoiste zapobieganie czynno-bierne:** szczepienie jw. + jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki (maks. do 7. dnia po niej) swoista immunoglobulina w dawce 20 j.m./kg mc.